

## Tourniquet (am Beispiel CAT)

Name und Klasse Studierende/r: \_\_\_\_\_

**Spezielles:** Für die Ausbildung von Polizisten und Armeeangehörigen schulen wir nur die Vorgehensweise bei taktischer Indikation  
**Material:** Übungsphantom, Einmalhandschuhe, Tourniquet, Stift (wasserfest)

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt  OSCE nicht erfüllt  Datum & Unterschrift Ausbilder: \_\_\_\_\_

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
Handschuhe anziehen oder benennen			
Indikation benennen: <b>Takt. Indikation:</b> care under fire, MANV, nicht Erreichbarkeit der Blutungsstelle etc. (1/2) <b>Med. Indikation:</b> Blutstillung mit Druckverband unmöglich, Amputation proximal Hand- / Fussgelenk, grosse, zerfetzte Wunden (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gefahren benennen: venöse Stauung, Schmerzen, Gewebsschädigung, Kompartment-Syndrom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Patienten über das Vorgehen und geplante Massnahme informieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Taktische Indikation:</b> Tourniquet "high and tight" straff anlegen (1/2) <b>Medizinische Indikation:</b> Tourniquet handbreit proximal der Verletzung straff anlegen (2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tourniquet durch Drehen des Knebels anziehen, bis die Blutung steht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Knebel im Klemmhaken sichern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Restlichen Kompressionsriemen im Arretierungshaken einschlaufen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tourniquet mit Klettband sichern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zeit der Anlage dokumentieren (auf Tourniquet, Protokoll, PLS...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tourniquet nicht bedecken, damit es nicht übersehen wird!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wenn Blutung mit dem Tourniquet nicht sistiert, zweites Tourniquet proximal des ersten anlegen (häufig bei unteren Extremitäten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notizen:

1 Quelle: NAEMT (2019) PHTLS, 9th Edition, Jones & Bartlett  
 2 DGAI (2019) Prehospitale Anlage von Tourniquets zur Kontrolle massiver Extremitätenblutungen