

PBLS Kind Zweihelfende mit Hilfsmittel

Name und Klasse Studierende/r:

Spezielles: Dieser OSCE setzt fortlaufende BLS durch eine*n zweite*n Helfer*in voraus und wird unter Einsatz eines AED durchgeführt


Material: BLS-Puppe Junior oder Baby, inkl. Gesicht, Handschuhe, AED

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt

OSCE nicht erfüllt

Datum & Unterschrift Ausbilder: _____

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Sicherstellen, dass die Thoraxkompression - ausser zur Beatmung und Defibrillation (inklusive Analyse) - nicht unterbrochen wird.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Material komplett vorbereiten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 AED einschalten, Kindermodus bei einem Kind unter 8 Jahre oder unter 25 kg auswählen und wenn vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Sprachanweisungen des Gerätes befolgen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05 Kleidung am Oberkörper des Kindes öffnen, falls noch nicht erfolgt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Elektroden nacheinander auf das Brustbein und den Rücken unter 8 Jahre und 25 kg aufkleben, über 8 Jahre oder bei einem Körpergewicht über 25 kg wird eine Elektrode unterhalb des rechten Schlüsselbeins, die andere unterhalb der linken Achselhöhle geklebt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 <p>Unter 8 Jahre oder 25 kg Über 8 Jahren oder 25 kg</p>			
07 Darauf achten, dass niemand während der Analyse das Kind berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Schockwarnung (z.B. "Achtung Defibrillation – Weg vom Patienten – Achtung Schock") und Kontrollblick, dass niemand das Kind berührt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09 Schocktaste drücken - Schock abgeben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Unverzüglich mit Thoraxkompressionen und Beatmung fortfahren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Notizen:

Quelle: Swiss Resuscitation Council (2025). Kursrichtlinien 2025 V1.0. Download am 20.02.2026 unter [SRC_kursrichtlinien_d_V1_06_25.pdf](#)