

BLS inkl. AED Kind SRC

Name und Klasse Studierende/r:

Spezielles: Dieser OSCE setzt fortlaufende BLS durch eine*n zweite*n Helfer*in voraus und wird unter Einsatz eines AED durchgeführt

Material: BLS-Puppe Junior inkl. Gesicht, Handschuhe, AED

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.



OSCE erfüllt

☐

OSCE nicht erfüllt

☐

Datum & Unterschrift Ausbilder:

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Sicherstellen, dass die Thoraxkompression - ausser zur Beatmung und Defibrillation (inklusive Analyse) - nicht unterbrochen wird.	☐	☐	☐
02 Material komplett vorbereiten	☐	☐	☐
03 AED einschalten, Kindermodus bei einem Kind unter 8 Jahre oder unter 25 kg auswählen und wenn vorhanden	☐	☐	☐
04 Sprachanweisungen des Gerätes befolgen	☐	☐	☐
05 Kleidung am Oberkörper des Kindes öffnen, falls noch nicht erfolgt	☐	☐	☐
06 Elektroden nacheinander auf das Brustbein und den Rücken unter 8 Jahre und 25 kg aufkleben, über 8 Jahre oder bei einem Körpergewicht über 25 kg wird eine Elektrode unterhalb des rechten Schlüsselbeins, die andere unterhalb der linken Achselhöhle geklebt.	☐	☐	☐
  Unter 8 Jahre oder 25 kg Über 8 Jahren oder 25 kg			
07 Darauf achten, dass niemand während der Analyse das Kind berührt	☐	☐	☐
08 Schockwarnung (z.B. "Achtung Defibrillation – Weg vom Patienten – Achtung Schock") und Kontrollblick, dass niemand das Kind berührt	☐	☐	☐
09 Schocktaste drücken - Schock abgeben	☐	☐	☐
10 Unverzüglich mit Thoraxkompressionen und Beatmung fortfahren	☐	☐	☐

Notizen:

Quelle: Swiss Resuscitation Council (2025). Kursrichtlinien 2025 V1.0. Download am 20.02.2026 unter [SRC_kursrichtlinien_d_V1_06_25.pdf](#)