

BLS Kind SRC

Name und Klasse Studierende/r:

Spezielles: Es wird angenommen, dass die Helfer ohne Hilfsmittel auf den Patienten treffen.

Material: PBLS-Puppe Junior inkl. Gesicht, Handschuhe

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt

☐

OSCE nicht erfüllt

☐

Datum & Unterschrift Ausbilder: _____

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Selbstschutz sicherstellen	☐	☐	☐
02 Handschuhe anziehen oder benennen	☐	☐	☐
03 Das Kind leicht stimulieren, Ansprechen – Keine Reaktion	☐	☐	☐
04 Um Hilfe rufen und alarmieren und AED anfordern	☐	☐	☐
05 Wenn kein Handy verfügbar, erst eine Minute BLS vor der Alarmierung	☐	☐	☐
06 Atmung prüfen, Atemwege freimachen (Kopf in neutral Position) - Der Patient atmet nicht (oder nicht normal)	☐	☐	☐
07 5 initiale Beatmungen	☐	☐	☐
08 Patienten auf einer harten Unterlage lagern	☐	☐	☐
09 15 Thoraxkompressionen durchführen (Druckpunkt Brustbein untere Hälfte wählen, Handballen bzw. Finger der einen Hand auf dem Sternum platzieren, mit gestrecktem Armen aus der Hüfte den Thorax mit einer Frequenz von 100-120 / min, 1/3 des Thoraxdurchmesser Tiefe, dann vollständige Entlastung)	☐	☐	☐
10 2x beatmen, Unterkiefer anheben, Mund des Patienten schliessen, den eigenen Mund über der Nase des Patienten platzieren, zwei Atemstösse geben, alternativ ist Mund zu Mund Beatmung möglich.	☐	☐	☐
11 Beatmen so, dass Brustkorbhebung sichtbar ist. Dauer je ca. 1 sek.	☐	☐	☐
12 Wenn Beatmung nicht möglich oder nicht erlernt, nur Herzdruckmassage durchführen			
13 Weiter im Verhältnis 15:2			

Notizen:

