

BLS Säugling SRC

Name und Klasse Studierende/r: _____

Spezielles: Es wird angenommen, dass die Helfer ohne Hilfsmittel auf das Kind treffen

Material: PBLS-Puppe Säugling, Handschuhe

Der OSCE ist erfüllt, wenn die Arbeitsschritte in unten beschriebener oder begründet anderer Reihenfolge korrekt ausgeführt wurden.

OSCE erfüllt

☐

OSCE nicht erfüllt

☐

Datum & Unterschrift Ausbilder: _____

	erfüllt	nicht erfüllt	nicht beurteilbar
01 Selbstschutz sicherstellen	☐	☐	☐
02 Handschuhe anziehen oder benennen	☐	☐	☐
03 Das Kind leicht stimulieren, Ansprechen – Keine Reaktion	☐	☐	☐
04 Alarmieren, um Hilfe rufen und AED anfordern	☐	☐	☐
05 Atemwege durch Überstrecken des Kopfes und Heben des Kinns freimachen und Atmung durch Sehen, Hören und Fühlen überprüfe (bis 1 Jahr - Atemwege freimachen durch Schulter unterpolstern damit der Kopf in einer neutralen Position liegt): Kind atmet nicht oder nicht normal	☐	☐	☐
06 Kleidung am Oberkörper des Kindes öffnen			
07 5 x initiale Beatmungen verabreichen, dazu Kopf überstrecken, Unterkiefer anheben, Mund des Kindes schliessen, den eigenen Mund über Mund und der Nase des Kindes platzieren	☐	☐	☐
08 15 x Herzdruckmassage durchführen (Druckpunkt Brustbein untere Hälfte wählen, mit einer oder zwei Händen (ab 1 Jahr) bzw. beide Daumen (unter 1 Jahr) auf dem Brustbein platzieren, mit gestrecktem Armen aus der Hüfte den Brustkorb mit einer Frequenz von 100-120 / min, 1/3 des Brustkorb - Durchmessers Tiefe, dann vollständige Entlastung)	☐	☐	☐
			
09 2 Beatmungen verabreichen	☐	☐	☐
10 Beatmung erfolgt so, dass eine Brustkorbhebung erkennbar ist. Dauer je ca. 1 s	☐	☐	☐
11 Wenn Beatmung nicht möglich oder nicht erlernt, nur Herzdruckmassage durchführen	☐	☐	☐
12 Weiter im Verhältnis 15:2	☐	☐	☐

Notizen:

Quelle: Swiss Resuscitation Council (2025). Kursrichtlinien 2025 V1.0. Download am 20.02.2026 unter [SRC_kursrichtlinien_d_V1_06_25.pdf](#)